

NAROČILNICA ZA LABORATORIJSKE PREISKAVE

Priimek in ime	
Datum rojstva	
Spol	M Ž
Naslov	
KZZ	

Datum	
Ura odvzema	
Naročnik	Osebno
Zdravnik	Igor Goričan, dr.med., spec. (VitalMed)
Opombe	Za IV terapijo z železom

Biokemične preiskave (serum)	
	AST
	ALT
	GGT
	ALKALNA FOSFATAZA
	CK
	LDH
	alfa AMILAZA
	LIPAZA
	BILIRUBIN - celokupni
	BILIRUBIN - direktni
	SEČNINA
	KREATININ
	URAT
	GLUKOZA
	HOLESTEROL
	TRIGLICERIDI
	HDL HOLESTEROL
	LDL HOLESTEROL
X	ŽELEZO
X	TIBC
X	TRANSFERIN
X	SATURACIJA TRANSFERINA
X	FERITIN
	KALIJ
	NATRIJ
	KLORIDI
	KALCIJ
	FOSFAT
	MAGNEZIJ
	PROTEINI
	ALBUMIN
	RF
	CRP
	CRP visoko občutljiv

Hematološke preiskave (EDTA)	
X	HEMOGRAM + DKS
	DKS ROČNO
	RETIKULOCITI
	SEDIMENTACIJA
	HbA1C

Koagulacijske preiskave (Na-citrat)	
	PČ, INR
	APTČ
	D-DIMER

Urinske preiskave	
	OSNOVNA ANALIZA
	SEDIMENT
	URICULT
	TEST NOSEČNOSTI

Blato	
	PARAZITI
	PRISOTNOST KRVI
	HELICOBACTER PYLORI

Vitamini (serum)	
	VITAMIN B12
	FOLNA KISLINA
	VITAMIN D

Drugo (serum)	
	IgA
	IgE
	NT-proBNP
	MIOGLOBIN
	TROPONIN I (hs)
	Anti-SARS-CoV-2

Ščitnica (serum)	
	TSH
	ft3
	ft4
	anti TPO
	anti TG

Tumorski označevalci (serum)	
	PSA - celokupni
	PSA - prosti
	Ca 125
	CEA
	Ca 19-9
	Ca 15-3
	alfa FETOPROTEIN

Hormoni (serum)	
	beta hCG
	FSH
	LH
	PROLAKTIN
	ESTRADIOL
	PROGESTERON
	TESTOSTERON - celokupni
	KORTIZOL
	DHEA-S
	iPTH

Posebni odvzem	
	HOMOCISTEIN

Hitri test (serum ali EDTA)	
	INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA

Opombe:

--

PRIPRAVA NA ODVZEM KRVI



Pomembno je, da se na odvzem krvi ustrezno pripravite.

- Pridite v dopoldanskem času.
- Neposredno pred odvzemom se v čakalnici psihično in fizično sprostite.
- Eno uro pred odvzemom ne kadite.
- Bodite tešči, kar pomeni, da zadnjih 12 ur uživate samo vodo.
- Dan pred odvzemom se izogibajte pretirani fizični aktivnosti.

Če vam odvzem krvi vzbuja nelagodje, to povejte in se prepustite našemu strokovno usposobljenemu in prijaznemu osebju.

Za obisk se ni potrebno naročiti. Pri vходу v laboratorij vzemite listek s številko in vstopite na sprejem, ko ste na vrsti.

Po zaključenem odvzemu si tampon pritiskajte na mesto vboda vsaj še 5 minut oziroma toliko časa, da se krvavitev popolnoma zaustavi. V nasprotnem primeru lahko pride do nastanka podplutbe.